Bac Blanc 2019	DEVOIR SYNTHESE 3. <u>4° Sciences Techniques.</u>	Le : 18-05-2019 (3 h).
LYCÉE HABIB BOURGUIBA-DAHMANI MR: WEILI. ADEL.	4 ^{°T1} .
LYCÉE AHMED AMARA-KEF MR: SMAALI. MONDHER.	4 ^{°T2} .

N.B :

Le sujet comporte 4 pages et 1 annexe à rendre avec votre copie.
 Tenez bien à la clarté des rédactions et la propreté des copies.
 L'utilisation des portables est interdite. Calculatrices sont autorisées.

Ex

•

La courbe Γ ci-dessus est la représentation graphique, dans un repère orthonormé (O, i, j) , d'une fonction f définie et continue sur $\mathbb{R}$.
 Δ est la droite d'équation: $y=x$.
 Γ et Δ sont sécantes en un seul point de coordonnée (x_0, x_0) .

On considère la suite U définie sur $\mathbb{N}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n), \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- 1) montrer par récurrence que : $0 \leq u_n \leq x_0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 2) dresser le tableau de signes de $f(x)-x$.
- 3) montrer que la suite U est croissante.
- 4) déduire que U est convergente et déterminer sa limite.

Ex

Une étude sur la durée de service à la caisse d'un magasin a donné les résultats suivants :

t	0	60	120	180	240	320	360	400	480
p	0	0,16	0,33	0,43	0,5	0,6	0,64	0,67	0,7

Où : **p** est la proportion de clients servis en une durée inférieure à un temps **t** (en secondes).

On donne le nuage de point de la série statistique (t, p).

1) un ajustement affine de cette série statistique est-il bien justifié ?
Ce nuage permet d'envisager un ajustement de type exponentiel.
On pose $Y = \ln\left(\frac{1}{1-p}\right)$. les valeurs de Y, seront arrondies à 10^{-3} près.

2)

a) recopier et compléter le tableau suivant :

t	0	60	120	180	240	320	360	400	480
Y	0	0,174	0,400	...	...	...	...	1,109	1,204

b) Calculer le coefficient de corrélation de la série (t ; Y).

c) Un ajustement affine de la série (t ; Y) est – il justifier ?

3)

a) déterminer, par la méthode de moindres carrés, une équation de la droite de régression de Y en t.

b) En déduire que l'expression de p en fonction de t est de la

forme $p = 1 + \alpha \cdot e^{\beta t}$ où α et β sont deux réels dont on donnera les valeurs arrondies à 10^{-3} près.

4)

a) Estimer la proportion des clients servis en une durée inférieure à 5 minutes.

b) Après combien de secondes, 90% des clients seront servis ?

A) La durée de vie V (en jours) d'une batterie électrique suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

1) une batterie survit à une utilisation entre **10** et **20** jours avec une probabilité de **0,25**.

Montrer que la valeur de λ , est $\lambda = \frac{\ln 2}{10}$

2) on prendra $\lambda \approx 0,07$. arrondir les résultats à 10^{-3} près

a) Quelle est la probabilité qu'une batterie ne survive pas plus que **10** jours ?

b) Quelle est la probabilité qu'une batterie reste en état de fonctionnement après **20** jours ?

c) sachant qu'une batterie a fonctionné **10** jours, quelle est la probabilité qu'elle survivra encore moins que **20** jours ?

B) On dispose, dans une boîte, un lot de **10** batteries dont **4** sont chargées et les autres sont déchargées.

1) une épreuve consiste à prélever au hasard, successivement et sans remise **3** batteries de la boîte.

a. calculer la probabilité **p** d'obtenir une seule batterie chargée.

b. soit X la variable aléatoire donnant le rang k de la première batterie chargée tirée ($k \in \{1, 2, 3\}$); et 0 si pas de batterie chargée tirée.

Donner la loi de probabilité de X .

2) on répète l'épreuve précédente **n** fois de suite (les épreuves sont supposées indépendantes).

a) Déterminer, en fonction de n , la probabilité **p_n** d'obtenir au moins une seule fois une seule batterie chargée parmi les trois batteries prélevées.

b) Combien de fois au moins peut-on répéter l'épreuve pour que **p_n ≥ 0,999**.

Ex

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{(1+e^{-x})^2}$ dont sa représentation graphique Γ est donnée avec la droite $\Delta : y=x$ dans un repère orthonormé (O, i, j) en annexe.
 Les droites d'équations $y=2$ et $y=0$ sont deux asymptotes à Γ .
 Le point d'intersection de Γ et Δ est de coordonnées (α, α) .

A)

- 1) Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J que l'on précisera.
- 2) Vérifier que la fonction g définie sur J par $g(x) = \ln\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}-\sqrt{x}}\right)$ est la fonction réciproque de f .
- 3) déterminer $g\left(\frac{1}{2}\right)$. Tracer soigneusement la courbe Γ' de g dans le même repère que Γ . (en annexe)

B)

- 1) vérifier que $f(x) = \frac{2e^x}{1+e^x} - \frac{2e^x}{(1+e^x)^2}$
- 2) on désigne par $\mathcal{P}$ la partie du plan limitée par la courbe Γ et les droites d'équations $x=0$, $x=\alpha$ et $y=\alpha$.
 On note $\mathcal{A}$ l'aire de $\mathcal{P}$.
 - a) Hachurer $\mathcal{P}$ (en vert).
 - b) montrer que : $\mathcal{A} = \alpha^2 - 2 \ln\left(\frac{1+e^\alpha}{2}\right) - \frac{2}{1+e^\alpha} + 1$
 - c) donner une interprétation géométrique de l'intégrale $I = \int_{1/2}^{\alpha} \ln\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}-\sqrt{x}}\right) dx$
 - d) en déduire, en fonction de α , la valeur de I .
- 3) Hachurer (en rouge) la partie $\mathcal{P}'$ du plan limitée par les courbes Γ et Γ' et les deux axes du repère, puis déterminer son aire $\mathcal{A}'$ en fonction de α .

Annexe.

Nom&Prénom.....classe.....n°.....

CORRECTION

EX1.

- 1) * $u_0 = 0$; $0 \leq u_0 \leq x_0$: vrai pour le 1^{er} terme
 * si $0 \leq u_n \leq x_0$ a-t-on aussi $0 \leq u_{n+1} \leq x_0$?
 $0 \leq u_n \leq x_0 \Leftrightarrow f(0) \leq f(u_n) \leq f(x_0)$ car f est croissante.
 or $f(0) > 0$ et $f(x_0) = x_0$ donc $0 < u_{n+1} \leq x_0$
 d'après le principe de récurrence : $0 \leq u_n \leq x_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2)

x	-∞	x ₀	+∞
f(x)-x	+	-	

- 3) $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$ car $0 \leq u_n \leq x_0$
 → (u_n) est croissante.
- 4) * (u_n) est croissante et majorée par x_0 donc elle est convergente.
 * $\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ (u_n) \text{ converge vers } L \\ L \in [0, x_0] \\ f \text{ continue sur } [0, x_0] \end{cases} \rightarrow f(L) = L$ par suite $L = x_0$.

EX2.

- 1) Les points du nuage sont presque alignés.
 Donc, un ajustement affine est justifié.

2)

a)

t	0	60	120	180	240	320	360	400	480
Y	0	0,174	0,400	0,562	0,693	0,916	1,022	1,109	1,204

b)		r =	0.99343		
c)		$r > 0.75 \rightarrow$	ajustement	vérifié	
3)a)	Y =	$0,003 t$	$+0,054$		
b) =>	$1/(1-p) =$	$e(0,054) *$	$e(0,003t)$		
	$1-p =$	$0.947 *$	$e(-0,003t)$		
	p =	1	-	0,947	$e(-0,003t)$
4)					
a) t=5mn => t=300					
	$\Rightarrow p =$	$1 - 0,947 e(-0,9)$	$= 0,614$	$\approx 0,61$	
b) 90% => p=0,9		$\Rightarrow t = 749 \text{ s}$			

EX3.

A.

- 1) $p(10 \leq V \leq 20) = 0,25 \Leftrightarrow e^{-10\lambda} - e^{-20\lambda} = 0,25$
 on pose $a = e^{-10\lambda} \rightarrow a - a^2 = 0,25 \Leftrightarrow a^2 - a + (0,5)^2 = 0 \Leftrightarrow (a - 0,5)^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0,5$
 $e^{-10\lambda} = 0,5 = 1/2 \Leftrightarrow \lambda = \frac{\ln(\frac{1}{2})}{-10} = \frac{\ln 2}{10} \cong 0,07$
- 2) a) $p(V \leq 10) = 1 - e^{-10\lambda} = 1 - e^{-0,7} \sim \mathbf{0,503}$
 b) $p(V \geq 20) = e^{-20\lambda} = e^{-1,4} \sim \mathbf{0,247}$
 c) $p(V \leq 30 | V \geq 10) = \frac{p(V \leq 30 \cap V \geq 10)}{p(V \geq 10)} = \frac{p(10 \leq V \leq 30)}{p(V \geq 10)} = \frac{e^{-0,7} - e^{-2,1}}{e^{-0,7}} = 0,753$

B.

- 1) a) $p = C_3^1 \cdot \frac{A_4^1 \cdot A_6^2}{A_{10}^3} = 3 \cdot \frac{4 \cdot 30}{720} = 0,5$
 b) * $p(X = 0) = \frac{A_6^3}{A_{10}^3} = \frac{120}{720} \cong 0,167$
 * $p(X = 1) = \frac{A_4^1 \cdot A_9^2}{A_{10}^3} = \frac{288}{720} \cong 0,4$
 * $p(X = 2) = \frac{A_6^1 \cdot A_4^1 \cdot A_8^1}{A_{10}^3} = \frac{192}{720} \cong 0,266$
 * $p(X = 3) = \frac{A_6^2 \cdot A_4^1}{A_{10}^3} = \frac{120}{720} \cong 0,167$
- 2) on a une loi binomiale de paramètres n et $p = 1/2$
 a) $p_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$
 b) $p_n \geq 0,999 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 0,001 \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(0,001)}{\ln(\frac{1}{2})} \Leftrightarrow n \geq 9,966$
 donc à partir de $n = 10$ on aura $p_n \geq 0,999$.

EX4.

A.

- 1) f est continue sur $\mathbb{R}$, en plus f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 Alors f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J = f(\mathbb{R}) =]0, 2[$
 car, $\lim_{+\infty} f(x) = 2$ et $\lim_{-\infty} f(x) = 0$ "deux asymptotes horizontales".
- 2) $f(g(x)) = \frac{2}{(1+e^{-g(x)})^2} = \frac{2}{\left(1+\frac{\sqrt{2}-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right)^2} = \frac{2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}\right)^2} = x$ pour $x \in J$.
- 3) $g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$.

la courbe Γ' est le symétrique de Γ par rapport à $\Delta : y = x$; elle passe par les deux points $(1/2, 0)$ et (α, α) et admet deux asymptotes verticales d'équation $x = 0$ et $x = 2$. (en annexe)

B.

- 1) $\frac{2e^x}{1+e^x} - \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} = \frac{2e^x(1+e^x)}{(1+e^x)^2} - \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} = \frac{2e^{2x}}{((1+e^{-x})e^x)^2} = \frac{2}{(1+e^{-x})^2} = f(x)$

2) a) $\mathcal{P}$ la partie du plan limitée par la courbe Γ et les droites d'équations $x=0$, $x=\alpha$ et $y=\alpha$. (colorée en vert en annexe).

$$\begin{aligned} \text{b) } A &= \text{aire du carré} - \text{aire}[\Gamma, (ox), x=0, x=\alpha] = \alpha^2 - \int_0^\alpha f(x) dx \\ &= \alpha^2 - \int_0^\alpha \left(\frac{2e^x}{1+e^x} - \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} \right) dx = \alpha^2 - \left[2\text{Ln}(1+e^x) + \frac{2}{1+e^x} \right]_0^\alpha \\ &= \alpha^2 - 2\text{Ln}\left(\frac{1+e^\alpha}{2}\right) - \frac{2}{1+e^\alpha} + 1 \end{aligned}$$

$$\text{c) } I = \int_{1/2}^\alpha \ln\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2-\sqrt{x}}}\right) dx = I = \int_{1/2}^\alpha g(x) dx : \text{l'aire de la région du plan}$$

Limitée par $[\Gamma', (ox), x=1/2, x=\alpha]$

$$\text{d) pour des raisons de symétrie } I = A = \alpha^2 - 2\text{Ln}\left(\frac{1+e^\alpha}{2}\right) - \frac{2}{1+e^\alpha} + 1$$

3) la partie $\mathcal{P}'$ du plan limitée par les courbes Γ et Γ' et les deux axes du repère est colorée en rouge (en annexe).

$$\begin{aligned} A' &= \text{aire du carré} - (A + I) \\ &= \alpha^2 - 2\left(\alpha^2 - 2\text{Ln}\left(\frac{1+e^\alpha}{2}\right) - \frac{2}{1+e^\alpha} + 1\right) \\ &= -\alpha^2 + 4\text{Ln}\left(\frac{1+e^\alpha}{2}\right) + \frac{4}{1+e^\alpha} - 2 \quad \text{u.a.} \end{aligned}$$

Annexe.